

Nu orice bebeluș prezintă toate aceste simptome și ele pot apărea în orice ordine.

Monitorizarea meningitei la bebeluși

Punct moale tensionat sau bombat

Temperatură mare

La bebelușii mai mici de 3 luni, poate fi normală sau scăzută

Foarte somnoros/
expresie fixă/oboseală
mult prea mare pentru a
se trezi

Stare de iritabilitate în
momentul în care este
luat, cu plâns ascuțit,
geamăit sau plând ciudat

Frisoare
extreme

Iritație sub forma unor
întepături de ac/semne
sau vânătăi de culoare
violetă oriunde pe corp

Uneori diaree

Mâini și
picioare reci

Starea bebelușului dvs. se
înrăutățește rapid? Bebelușii se
pot îmbolnăvi foarte rapid,
așa că verificați adesea.

Sunete neobișnuite de mormăit

Vomă/refuzul alimentației

Respirație rapidă/dificultate
de respirație

Piele pătată, paloare
sau albastruire

Corp rigid cu mișcări
sacadate sau altfel care
atârnă și fără viață

Durere/iritabilitate
de la dureri de mușchi
sau dureri serveră de
membre/articulații

Pentru informații și asistență, apelați linia noastră gratuită de asistență:

MAREA BRITANIE **080 8800 3344** | Irlanda **1800 41 33 44**

helpline@meningitis.org
www.meningitis.org



Meningita și Septicemia

lovește rapid și poate ucide

Ce ar trebui să fac dacă sunt îngrijorat(ă)?

Aveți încredere în instinctele dvs. Dacă credeți că bebelușul dvs. suferă de meningită sau septicemie, cereți de urgență sfatul medicului. Spuneți că sunteți îngrijorat(ă) că ar putea fi meningită sau septicemie.

Cunoașteți simptomele

Simptomele timpurii de meningită și septicemie (otrăvirea sângelui de la boală) poate fi asemenea altor boli de copilărie, însă bebelușul se va îmbolnăvi de obicei rapid, iar starea sa se va înrăutăți rapid.

Atenție la iritații mici sub forma unor înțepături de culoare roșie sau maro care se poate schimba în pete violete sau blistere cu sânge. Dacă bebelușul dvs. are o iritație, faceți „Testul Paharului”.

Puteți avea dificultăți în a vedea iritația pe pielea de culoare închisă, de aceea căutați puncte pe corpul întreg al bebelușului, în special pe zonele mai palide cum ar fi palmele, tălpile, pe burtă, în interiorul pleoapelor și pe cerul gurii.

Cum îmi pot proteja bebelușul?

Vaccinați-vă bebelușul. Vaccinurile oferă o protecție excelentă, dar nu pot preveni toate formele, așa că trebuie să cunoașteți simptomele.

Testul Paharului

Dacă un pahar de sticlă este apăsat ferm de o iritație cauzată de septicemie, semnele nu vor dispărea. Veți putea să le vedeți prin pahar. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți de urgență ajutor medical.

Nu uitați: un bebeluș foarte bolnav are nevoie de ajutor medical chiar dacă prezintă doar câteva puncte, o iritație care dispare sau nicio iritație.



Pentru informații și asistență, apelați linia noastră gratuită de asistență:

MAREA BRITANIE **080 8800 3344** | Irlanda **1800 41 33 44**

Bristol 0333 405 6262
info@meningitis.org

Edinburgh 0131 510 2345
edinburgh@meningitis.org

Belfast 028 9032 1283
belfast@meningitis.org

Dublin 01 819 6931
dublin@meningitis.org

A charity registered in England and Wales no 1091105, in Scotland no SC037586 and in Ireland 20034368.
Registered Office: Newminster House, Baldwin Street, Bristol BS1 1LT 03/2018



**Meningitis
Research
Foundation**